

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège
rédigé en collaboration avec MM. MOULET, BICARD, VENE, BOYER, DOVALE,
DONHOTTE, TERRE, BERNARD et FAURE.

N° 18 C du 18 mai 1990

GRANDES CULTURES N° 7

TOURNESOL : Risque PHOMOPSIS élevé - **TRAITEZ**

BLES : ROUILLE BRUNE - Passé la floraison arrêt des traitements sauf cas
très particuliers.

MAIS : 1° vol de la SESAMIE important. Protection des maïs semences dès
le stade 2 feuilles, dès réception.

POIS : Présence d'ANTHRACNOSE
Risque BOTRYTIS bien marqué.

TOURNESOL

PHOMOPSIS : Les conditions climatiques présentes sont extrêmement favorables à la
maladie.

Le niveau de projection d'Ascospores particulièrement élevé, observé dans nos pièges,
indique un très important risque de pollution et de contamination des cultures levées.

Les cultures les plus tardives sont au stade 2 F, les plus avancées au stade 8 F.

Traitez en priorité les plus précoces, les autres recevront un traitement de couverture
immédiatement après et ce, quelle que soit la variété, sensible ou tolérante.

Nous vous rappelons qu'en 1988, ce sont les variétés dites tolérantes qui ont été les
plus atteintes par les contaminations cotylédonaire, entraînant irrémédiablement la
disparition des plantes, en diminuant ainsi le potentiel de la culture.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67 92 41 42



Pour ces 1^{er} traitements n'utilisez que le **PELTAR FLO à 7 l/ha**
à partir du stade 6 feuilles

PELTAR FLO à 5 l/ha
de la levée (cotylédons) à 2 feuilles

Réglez votre pulvérisateur pour appliquer le volume minimum de bouillie
L'utilisation des fongicides à action pénétrante et systémique (I.B.S.- Morpholines et Triazoles) type **CORBEL** ou **PUNCH** est à réserver pour plus tard
Une seule application pour toute la période de végétation du tournesol

BLE

BLES TENDRES - BLES DURS : ROUILLE BRUNE

On n'observe pas de progression de la maladie. Nette régression sur les parcelles traitées normalement

Passé la floraison, sauf cas très particulier à solutionner avec votre technicien, vous n'avez plus de protection à effectuer sur ces cultures

En cas de nécessité reportez vous à notre précédent bulletin (N° 6 du 3 Mai 90)

MAIS SEMENCES

Précoce et abondant le 1^{er} vol de la **SESAMIE** nous conduit à vous conseiller de protéger les cultures ou fraction de cultures levées dès le stade 2 feuilles
Intervenez à l'aide d'une des solutions suivantes :

22882806-90-12 870

DIMILIN	0,5	kg/ha
DECIS CE	0,4	l
SUMICIDIN 10	0,75	l

Un réglage judicieux de l'appareil de pulvérisation doit permettre de substantielles économies de produits.

POIS PROTEAGINEUX

Ces cultures sont très belles dans l'ensemble; on peut observer cependant dans certaines situations une recrudescence de l'**ANTHRACNOSE**

Le risque **DOTRYTIS** est important

Les **PUCERONS** ont été bien contrôlés en général

Si vous êtes dans une situation à risques ou si le complexe pré-cité évolue, il est nécessaire de préserver le potentiel de la culture; intervenez avec :

BRAVO PLUS ou **CERECLAIR** 2 l/ha

+ Pucerons et Bruches (couverture importante sur pois semences)

SERE	1,5 l/ha
BAYTHOID	0,3 l
TALSTAR	0,2 l

